


# АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

контагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся сверхострым, острым, подострым, реже хроническим течением и большой летальностью. Болеют домашние и дикие свиньи независимо от возраста и породы.



**Эффективных вакцин против африканской чумы свиней не разработано.**

**Больных африканской чумой животных лечить запрещено! Все свиньи в эпизоотическом очаге подлежат уничтожению бескровным методом с последующим их сжиганием. С целью предупреждения АЧС, важно соблюдать правила профилактики заноса заболевания в свиноводческие хозяйства и подворья. В случае подозрения, незамедлительно обращаться к ветеринарным специалистам.**

Клинические признаки

При естественных условиях заражения инкубационный период длится 2-9 дней. Болезнь протекает молниеносно, остро (смертность 98-100%) и хронически (смертность 50-60%). При молниеносном течении животные гибнут внезапно. При остром течении у животных повышается температура тела до 42,5 без других видимых признаков в течение 2-3 дней, а затем развивается одышка, аритмия сердца, аппетит отсутствует, повышенная жажда, появляются рвота, парезы и параличи конечностей, серозные и серозно-геморрагические истечения из носовой полости и глаз. Походка становится шаткой. Отмечается тремор, конвульсии, судороги.

К африканской чуме восприимчивы домашние животные и дикие свиньи независимо от возраста. Источником возбудителя инфекции служат больные и переболевшие свиньи. Вирусосистельство у отдельных животных до двух лет и более. Из организма животных вирус выделяется со всеми секретами и экскрементами. В естественных условиях заражение легко происходит при совместном содержании больных свиней со здоровыми, главным образом алиментарным путем. Заражение возможно также аэрогенным путем через поврежденную кожу и при укусе зараженными клещами.

Профилактика заноса заболевания в свиноводческие хозяйства и подворья:

- запретить выгульное содержание свиней
- провести ограждение ферм
- на въездах оборудовать пункты дезинфекции автомобилей
- проводить ежедневный клинический осмотр свинополовая
- всех свиней подвергать иммунизации против классической чумы и рожи
- запретить скармливание животным пищевых отходов без термической обработки
- ограничить перемещение животных
- проводить дезакаризаационные, дератизационные, дезинсекционные работы с контролем их эффективности.

**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ, ОБРАЩАТЬСЯ:**

**В ОТБУ "Усольская СББЖ"  
т.8(39543)6-28-92, 8-924-634-80-30**